

dinill[®]

cloreto de benzalcônio 0,01% ácido bórico 1,7%

FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÃO

Frasco plástico conta-gotas contendo 10 ml de solução oftálmica estéril.

USO ADULTO

COMPOSIÇÃO

SOLUÇÃO OFTÁLMICA

Cada ml contém: 0,1 mg de cloreto de benzalcônio e 17 mg de ácido bórico
Veículo: hidrolato de hamamelis, hidrolato de camomila, borato de sódio, ácido clorídrico/ hidróxido de sódio e água purificada q.s.p.

INFORMAÇÃO AO PACIENTE

- Ação esperada do medicamento: ação anti-séptica, levemente adstringente e descongestionante.
- Cuidados no armazenamento: o produto deve ser armazenado a temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C).
- Prazo de validade: vide cartucho. Não use medicamento com prazo de validade vencido.
- Gravidez e lactação: na ocorrência de gravidez ou se estiver amamentando, consulte o médico antes de fazer uso de medicamentos.
- Cuidados de administração: instile a dose recomendada, no saco conjuntival, evitando tocar a ponta do frasco nos tecidos oculares. Siga a orientação de doses indicada em "Posologia".
- Reações adversas: informe ao seu médico o aparecimento de reações desagradáveis.

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

NÃO USE REMÉDIO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO, PODE SER PERIGOSO PARA A SAÚDE

Informação Técnica

Pertencendo a classe dos compostos anti-sépticos de superfície, o cloreto de benzalcônio apresenta atividade bactericida contra microrganismos Gram-positivos e Gram-negativos. O ácido bórico é um desinfetante clássico em Oftalmologia, possuindo propriedades bacteriostática e fungistática.

Em função dos princípios ativos constituintes, Dinill[®] (cloreto de benzalcônio e ácido bórico) age como anti-séptico ocular, auxiliar no tratamento de conjuntivites e irritações oculares. Seu veículo isotônico e estéril apresenta os hidrolatos de hamamelis e camomila, de suave ação adstringente e descongestionante.

Indicações

Na anti-sepsia e limpeza dos olhos irritados por pó, vento ou corpo estranho e na higiene dos olhos após banho de mar ou piscina.

Contra-Indicações

Não se conhecem contra-indicações ao uso do produto.

Precauções

Não são necessárias precauções especiais no uso do produto.

Advertências

Produto de uso exclusivo em adultos. O uso em crianças representa risco à saúde (devido a presença de ácido bórico e seus derivados na formulação).

Interações Medicamentosas

Não são conhecidas interações com outros medicamentos.

Posologia

Instilar 2 gotas da solução oftálmica em cada olho, 2 a 3 vezes por dia.

Superdosagem

Em geral, superdosagens não provocam problemas agudos. Se, acidentalmente, for ingerido, beber bastante líquido para diluir, ou procurar orientação médica.

Pacientes Idosos

Não existem restrições de uso em pacientes idosos. A posologia é a mesma que a recomendada para as outras faixas etárias.

SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR. NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS, PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA

Nº de lote, data de fabricação e prazo de validade: vide cartucho.

Reg. ANVISA/MS - 1.0147.0102

Farm. Resp.: Dra. Flávia Regina Pegorer

CRF-SP nº 18.150



ALLERGAN

Qualidade e Tradição a Serviço da Oftalmologia

ALLERGAN PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA

Av. Guarulhos, 3.272 - CEP 07030-000 - Guarulhos - SP

CNPJ 43.426.626/0009-24

Indústria Brasileira

® Marca Registrada

Texto adaptado à portaria 110/97

72179BR10X - Laetus: 196

Serviço de Atendimento ao Consumidor

0800-144077

Discagem Direta Gratuita