

3 - PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS:

Doses excessivas podem provocar perturbações gastrointestinais como náuseas, regurgitações, vômitos e diarreia.

4 - INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS:

Os antiácidos podem reduzir a absorção de certos fármacos particularmente tetraciclina, fenitoína, digoxina, agentes hipoglicêmicos e antagonistas H₂. Desta forma, GASTROGEL® deve ser administrado pelo menos uma hora antes ou depois da administração destes medicamentos.

5 - POSOLOGIA:

Suspensão:

AGITE A SUSPENSÃO ANTES DE USAR.

CRIANÇAS: 1 colher de chá (5 mL), 1 a 2 vezes ao dia.

ADULTOS: 1 a 2 colheres de sobremesa (10 mL), 4 vezes ao dia.

6 - Superdosagem:

Na eventualidade da ingestão acidental de doses muito acima das preconizadas, recomenda-se adotar as medidas habituais de controle das funções vitais.

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

GASTROGEL®

hidróxido de alumínio
hidróxido de magnésio
simeticona

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

1 - NOME GENÉRICO:

hidróxido de alumínio, hidróxido de magnésio, simeticona.

2 - FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÃO:

Suspensão oral em embalagem contendo frasco de 150 mL.

Suspensão oral em embalagem contendo frasco de 240 mL.

USO ADULTO E PEDIÁTRICO

COMPOSIÇÃO

CADA 10 ML DE SUSPENSÃO ORAL CONTÊM:

hidróxido de alumínio.....	400 mg
hidróxido de magnésio.....	300 mg
simeticona.....	30 mg
Veículo QSP.....	10 mL

(celulose microcristalina, carmelose sódica, hipoclorito de sódio, sacarina sódica di-hidratada, metilparabeno, propilparabeno, álcool etílico, aroma de laranja, sorbitol, ciclamato de sódio e água purificada).

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

1 - AÇÃO ESPERADA DO MEDICAMENTO:

Indicado como antiácido para alívio sintomático da hiperacidez associada com o diagnóstico de úlcera péptica, gastrite, esofagite e hérnia de hiato. Como antiflatulento para alívio dos sintomas de gases, inclusive quadros pós-operatórios.

Venda sem prescrição médica
Data de fabricação, Prazo de validade e N° do lote: vide cartucho
MS nº 1.0917.0038
Farm. Resp.: Dr. Jadir Vieira Junior - CRF - MG nº 10.681
SAC 0800 0324087
www.medquimica.com

MEDQUÍMICA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S.A.
RUA OTACÍLIO ESTEVES DA SILVA, 40 - GRANJAS BETÂNIA
CEP 36.047-400 - JUIZ DE FORA - MG - CNPJ 17.875.154/0001-20
INDÚSTRIA BRASILEIRA



2 - CUIDADOS DE ARMAZENAMENTO:

Conservar em local fresco.

3 - PRAZO DE VALIDADE:

Data de fabricação, prazo de validade e nº do lote: vide cartucho.

“NÃO SE DEVE UTILIZAR O PRODUTO ALÉM DO PRAZO ESTABELECIDO, SOB O RISCO DE NÃO PRODUZIR OS EFEITOS DESEJADOS”.

4 - GRAVIDEZ E LACTAÇÃO:

“Informe seu médico a ocorrência de gravidez ou lactação na vigência do tratamento ou após o seu término”.

“INFORME AO SEU MÉDICO CASO ESTEJA AMAMENTANDO”.

5 - CUIDADOS DE ADMINISTRAÇÃO:

Agite o frasco da suspensão antes de usá-lo.

Os comprimidos deverão ser bem mastigados, não degluti-los por inteiro.

“Siga a orientação do seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento”.

6 - INTERRUPÇÕES DO TRATAMENTO:

“Não interromper o tratamento sem o conhecimento de seu médico”.

7 - REAÇÕES ADVERSAS:

Doses excessivas podem provocar perturbações gastrointestinais como náuseas, vômitos e diarreia leve.

“Informe seu médico o aparecimento de reações desagradáveis”.

8 - INGESTÃO CONCOMITANTE COM OUTRAS

SUBSTÂNCIAS:

GASTROGEL® pode reduzir a absorção de certos fármacos (como tetraciclina, fenitoína, digoxina, agentes hipoglicemiantes); por este motivo, deve ser administrado uma hora antes ou depois desses medicamentos.

9 - CONTRAINDICAÇÕES E PRECAUÇÕES:

O produto não deve ser usado por pacientes com hipersensibilidade a algum dos componentes da fórmula. Pacientes com insuficiência renal só deverão utilizar o produto sob controle médico.

“NÃO TOME REMÉDIO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO, PODE SER PERIGOSO PARA A SUA SAÚDE”.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

GASTROGEL® é um antiácido e um antiflatulento em uma combinação balanceada de hidróxido de alumínio e de magnésio mais simeticona, que tem propriedades antiácidas e antiflatulentas, não constipantes. O hidróxido de alumínio e de magnésio possuem capacidade, amplamente conhecida, de neutralizar a acidez gástrica e sua associação com a simeticona, um polímero de sílica, de ação antiflatulenta, é importante no tratamento da aerofagia e da eliminação de gases excessivos acumulados no trato gastrointestinal, pois a formação de bolhas de gases neste segmento contribui para o aumento da acidez.

2 - CONTRAINDICAÇÕES:

Pessoas alérgicas aos componentes da fórmula.