

RILAN NASAL 4%

Cromoglicato dissódico

Solução nasal com aplicador dosimetrado

Uso adulto e (ou) pediátrico

Composição - RILAN NASAL

Cada ml contém: Cromoglicato dissódico 40 mg; Veículo q.s.p 1 ml.

Informações ao paciente - RILAN NASAL

Conservar o produto ao abrigo do calor excessivo e da luz. O prazo de validade é de 36 meses a partir da data de fabricação. Não utilizar o produto fora de seu prazo de validade, sob o risco de não produzir os efeitos desejados.

Instruções para uso

Remova a tampa e só então retire o grampo de segurança.

Pressione o frasco para cima com o polegar, e então deixe voltar até que libere um único jato.

Com o frasco na posição vertical, introduza a ponta na narina e pressione o frasco totalmente para cima e solte. Isto representa uma dose. Repita o procedimento na outra narina.

Ao término do uso, limpe a ponta do frasco e coloque a tampa. Para evitar o acionamento acidental, recoloque também o grampo de segurança.

Ação esperada do medicamento - RILAN NASAL

RILAN é um medicamento de efeito comprovado no tratamento preventivo da rinite alérgica e, como tal, deve ser usado regularmente, mesmo na ausência de sintomas. O efeito terapêutico máximo pode levar alguns dias para ser atingido.

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

Não use remédio sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para sua saúde.

Informações técnicas - RILAN NASAL

O cromoglicato dissódico, substância ativa de RILAN, usado topicamente na mucosa nasal, inibe a liberação de mediadores químicos dos mastócitos sensibilizados, tais como a histamina, a substância de reação lenta de anafilaxia (SRL- A) e fatores quimiotáticos que são responsáveis pela reação alérgica. A inibição da liberação destas substâncias irá prevenir os sintomas da rinite alérgica.

Indicações - RILAN NASAL

Tratamento profilático e sintomático da rinite alérgica.

Contra-indicações - RILAN NASAL

RILAN é contra- indicado em pacientes que apresentem hipersensibilidade ao cromoglicato dissódico, ou outros componentes da sua fórmula.

Precauções - RILAN NASAL

Como regra geral aplicável a todos os medicamentos, deve-se evitar o seu emprego nos primeiros 3 meses da gestação. Não se sabe se a droga é excretada no leite humano, como também não há informações que sugiram que o uso do cromoglicato dissódico por lactantes tenha qualquer efeito indesejável para a criança.

Reações adversas - RILAN NASAL

Durante os primeiros dias de uso pode ocorrer uma irritação local. Em raros casos podem ocorrer dificuldades respiratórias ou chiados.

Superdosagem - RILAN NASAL

Devido ao excepcional baixo nível de toxicidade local e sistêmica do cromoglicato dissódico, é improvável que a superdosagem cause algum problema, porém, caso for suspeitado, o tratamento deve ser de suporte e direcionado ao controle dos sintomas relevantes.

Interações medicamentosas - RILAN NASAL

Não foi observada nenhuma evidência de interação com outros fármacos.

Modo de usar - RILAN NASAL

Uso tópico.

Dosagem - RILAN NASAL

Adultos e crianças: Uma aplicação em cada narina, 2 a 4 vezes ao dia ou a critério médico. *Observação:* O frasco está parcialmente cheio para permitir o funcionamento adequado do dosímetro.

Nota - Sendo RILAN uma medicação profilática, é importante que o paciente mantenha uma dosagem regular, mesmo na ausência de sintomas.

Apresentação - RILAN NASAL

Frasco plástico dotado de aplicador nasal dosimetrado, contendo 13 ml da solução. Cada jato dosimetrado corresponde a 5,2 mg de cromoglicato dissódico.

Venda Sob Receita Médica.

UCI- FARMA Indústria Farmacêutica Ltda.

RILAN NASAL 4% - Laboratório

UCI FARMA
Rua do Cruzeiro, 374
São Bernardo do Campo/SP - CEP: 09725-310
Tel: (011)414-2022
Fax: (011)448-5253